第2類医薬品

胃もたれ・胸やけ・胃の痛みに

漢方胃腸薬「SP」(細粒)

安中散・芍薬甘草湯エキス末配合

安中散と芍薬甘草湯エキス末を配合した胃腸薬です。
胃の痛みや胃のもたれ、胸やけなど、胃腸の諸症状の改善に効果を発揮します。

効能・効果

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

商品パッケージ	商品名／容量	JAN コード	サイズ(幅×奥行×高さ)
	漢方胃腸薬「SP」(細粒) 36包	4 562378 460092	115㎜×50㎜×90㎜
	漢方胃腸薬「SP」(細粒) 50包	4 562378 460177	115㎜×75㎜×90㎜

SAiKYO PHARMA

【販売名】 漢方胃腸薬「SP」(細粒)

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、**食前又は食間に**服用してください。
食間(食事と食事の間)の服用は、**食事の後2〜3時間**を目安にしてください。

年　齢	成人(15歳以上)	5歳以上15歳未満	5歳未満
1回量	1包	½ 包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1包(1.2g)中

成　分	分　量
安中散(下記生薬の混合粉末)	**700mg**
ケイヒ(桂皮)	200mg
エンゴサク(延胡索)	150mg
ボレイ末(牡蠣)	150mg
ウイキョウ(茴香)	75mg
シュクシャ(縮砂)	50mg
カンゾウ(甘草)	50mg
リョウキョウ(良姜)	25mg
(はたらき) 胃腸のはたらきを活発にする作用があり、胃のもたれや胃部不快感などの症状を改善する効果があります。	

成　分	分　量
芍薬甘草湯エキス末(下記生薬の抽出乾燥エキス末)	**170mg**
シャクヤク(芍薬)	340mg
カンゾウ(甘草)	340mg
(はたらき) 胃腸の筋肉の緊張をやわらげる作用があり、胃痛や腹痛等をしずめます。	

※添加物として、カルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

<成分に関連する注意>
本剤は生薬を用いた製剤であるため、製品により色が多少異なることがありますが、品質に問題はありません。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)使用期間をすぎた製品は服用しないでください。

⚠使用上の注意

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。 ○心臓病の診断を受けた人

相談すること

①次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
○医師の治療を受けている人　○妊婦または妊娠していると思われる人　○高齢者　○むくみのある人
○今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人　○高血圧、腎臓病の診断を受けた人

②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

病状の名称	症　状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

③1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

④次の場合は、服用中又は服用後に、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。 ○長期連用する場合

製造販売元
株式会社サイキョウ・ファーマ
東京都江東区亀戸 5-6-21UIW9BLDG.5F　TEL：03-3682-6600(代)　FAX：03-3682-6262
お客様相談窓口　0120-456-787　受付時間(月〜金曜日 AM10：00〜PM5：00)　※土・日・祝日を除く
E-Mail：info@saikyo-pharma.co.jp

2012年6月改訂(記載要領変更に伴う改訂)